

फाल्गुण-चैत्रमा गर्नुपर्ने कृषि कर्महरु

खाद्यान्न बाली तर्फः

फाल्गुण

- गहुँ खेतीमा सिँचाई उपलब्ध छ भने एकपटक सिँचाई गर्न सके मुसा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नुका साथै वालीको उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ । चिस्यानको विचार गरी सिँचाई गरी हाल्नुहोस् ।
- मध्य पहाडी क्षेत्रमा र तल्लो पहाडी भागहरुमा मकै लगाउने बेला हुँदैछ ।
- मकै भित्र कोदो लगाउनु हुने कृषकहरुले गणेश- २ तथा मकालु-२ जातका मकैको वीउ लगाउनु वेश हुन्छ ।
- तराई तथा भित्री मधेशका कृषक दाजुभाइहरुले सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा चैते धान लगाउनुहोस् । यसका लागि छिटो पाक्ने र बढी उत्पादन दिने जातहरु सि.एच.- ४५, खुमल-३, चैते-२, चैते-४, विन्देश्वरी, पालुङ्ग-२ आदिको समयमै व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

धानको व्याड तयार गर्नु अघि हरियो मलको रूपमा रातो शिरिष, असुरो, तितेपाती आदिलाई माटोमा राम्ररी मिलाएर व्याडको तयारी गर्नुहोस् । यसले वेर्नाहरु राम्ररी सप्रन्छन् र पछि राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ ।

धानको व्याड राख्नु अघि धानको वीउ राख्नु अघि धानको वीउलाई नून पानीको घोलमा (दशभाग पानीमा १ भाग नून) डुवाएर ३-४ मिनेट चलाउनुहोस् । वीउमा मिसिएको भुस पानीमा तैरिन्छ र स्वस्थ वीउ भाँडोको पिँधमा थिग्रीन्छ । यसरी थिग्रीएको वीउमात्र व्याडमा रोप्नुपर्दछ ।

व्याडमा धानको वीउ छर्नु भन्दा पहिले वीउलाई २४ घण्टा पानीमा भिजाउनुहोस् र त्यसलाई निकालेर जमिनमा फिँजाई बोराहरुले छोपेर २४ घण्टासम्म गुम्स्याउनुहोस् । यसले गर्दा वीउमा अंकुरण हुन्छ र यस्तो वीउ छर्दा राम्रो वेर्ना तयार हुन्छ ।

चैते धान रोप्ने बेला भयो । गहुँ खेतमा नै धान रोप्ने हो भने गहुँ भित्र्याईहाल्नुहोस् ।

धान रोप्नु भन्दा पहिले नै जग्गाको खनजोत राम्ररी गरेर प्रति हेक्टर १० टनका दरले असुरो, तितेपाती, खिरो जस्ता स्थानीय स्याउलाहरु माटोमा मिलाउन सके उत्पादनमा राम्रो वृद्धि हुन्छ । (१४-४९% सम्म) ।

- गहुँ जौ पाक्ने बेला भएको हुनाले राम्ररी पाकेपछि काटेर थन्काउनुहोस् । गहुँ भण्डारण गर्नु अघि ३-४ घाम राम्ररी सुकाएर वीउको लागि भए ५०% मालाथायन धुलो २ ग्राम प्रति किलो वीउका दरले मिलाई, उपचार गरेर राख्नुहोस् । खाने गहुँ भण्डारण गर्दा सेल्फोस चक्की ३-४ वटा प्रति टनका दरले हावा नछिर्ने भकारीमा टम्म बन्दा गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो गहुँ खान प्रयोग गर्दा एकदिन घाममा सुकाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । वीउको लागि उपचार गरेर राखिएको गहुँ खान हुँदैन ।

- उच्च पहाडी भागमा धानको वीउ राख्ने समय भयो । तसर्थ, बढी उत्पादन दिने खालका पात्ले लोकल तथा छोमरोङ्ग जातका धानहरु समयमा नै सुरक्षित गरी राख्नुहोस् ।

तरकारी खेती :

फाल्गुन/चैत्र

- पछौटे काउली टिप्ने बेला भयो । बजारको अवस्था विचार गरी टिप्ने योजना बनाउनुहोस् ।
- लहरे परिवारका तरकारीहरु र गोलभेंडा, भण्टा, खुर्सानी आदि तरकारीका बेर्ना सार्नुहोस् । गर्मीको मौसम भएको हुँदा तरकारी वारीमा ४-५ दिनको फरकमा सिँचाई गर्दै रहनुहोस् ।
- उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु रोप्ने समय भयो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु नै खाद्यान्नको मुख्य श्रोत पनि भएको हुँदा यस भेगका कृषकहरुले विशेष ध्यान पुऱ्याउनु जरुरी हुन्छ । अन्नवालीको तुलनामा आलुलाई बढी मलजल चाहिने हुँदा राम्ररी कुहेको गोबर मल ३० डोको प्रति कठ्ठाका दरले राख्नुपर्दछ । रासायनिक मलको हकमा ७.५ के.जी. डि.ए.पी. ६.० के.जी. युरिया र ३.५ के.जी. पोटास प्रति कठ्ठाका दरले राख्नुपर्दछ । डि.ए.पी. र पोटासको पुरै मात्रा र युरियाको आधा भाग जग्गाको तयारी गर्दा एकनासले माटोमा मिलाउनुपर्दछ भने युरियाको बाँकी आधा भाग ३०-३५ दिनपछि आलु गोडेर टपड्रेस गरीदिनुपर्दछ । आलुमा डहुवा रोगको प्रकोप हुन सक्ने भएको हुँदा रोगको लक्षण देखा पर्नासाथ डाइथेन एम-४५ भन्ने विषादी ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्नुपर्दछ ।

फलफुल बाली :

फाल्गुण/चैत्र

- लेकाली फलफूलहरु स्याउ, नास्पाती, आरु, आरुबखडा आदिका बोटमा काँटछाँट गर्नुहोस् ।
- काँटछाँट गरी सकेपछि हाँगा काटेको ठाउँमा बोर्डो पेष्ट अथवा एकभाग खोटो र एक भाग मैत मिलाई लेप तयार पारी लगाउनुहोस् ।
- काँटछाँट गरी सकेपछि बोटको फेदबाट १-२ हात टाढा वरिपरि एक वित्ता जति गहिरो कुलेसो खनी मल राखेर पुर्नुहोस् । मल हालेपछि पानी दिनुहोस् र बोटको फेद वरिपरि सुकेको भारपात/पतिङ्गरले छोपिदिनु पर्दछ ।
- आँप, लिची जस्ता सदावहार फलफूलहरुमा पनि गोडमेल गरी मलजल गर्नुहोस् । आँपमा लाग्ने मधुवा कीरा नियन्त्रण गर्न थायोडा विषादि २.५ मि.लि. पानीमा घोलेर छर्नुहोस् ।

- केरा खेती गर्न इच्छुक कृषकहरूले वर्षा याममा भन्दा फाल्गुण- चैत्र महिनामा केरा लगाएमा बढी फाइदा लिन सकिने हुँदा यहि समयमा रोप्ने तयारी गर्नुहोस् ।
- अमिलो जातका फलफूलहरूमा एग्रीमिन ५ ग्राम/लिटर पानीमा घोलेर छर्नुहोस् ।

पशुपालन

- पशुहरूमा भ्यागुते, चरचरे र खोरेत रोगको प्रकोप देखापर्न सक्ने समय भएको हुँदा नजिकको पशुसेवा केन्द्र/उपकेन्द्र तथा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा सम्पर्क राखी यस्ता संक्रामक रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिहाल्नुहोस् ।
- तराई र भित्री मधेश क्षेत्रमा पशुहरूमा नाम्ले परजीविको आक्रमणले पशुहरूलाई दुःख दिने समय भएको हुँदा यसको रोकथाममा पनि तुरुन्त ध्यान दिनुहोस्
- घाँसको लागि मकै र टियोसेन्टी जस्ता वालीहरू लगाउने समय भयो ।